

綜合感冒劑 必舒康 膠囊 Biescon Capsules

衛署藥製字第033902號
GMP G-2261

一般感冒除頭痛、發燒外，常有流鼻涕、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛等症狀，因此單純的解熱鎮痛劑，常感不足以解除感冒之苦，本劑係針對緩解感冒所產生諸症狀所配合而成的一般綜合感冒劑。

作用：

1. Acetaminophen及Ethoxybenzamide兩者兼具解熱及鎮痛效果，能降低體溫及減少疼痛，諸如頭痛、肌肉酸痛等造成之不舒服。
2. Noscipine作用於咳嗽中樞，對鎮咳有效果。
3. dl-Methylephedrine HCl為麻黃素衍生物，能使支氣管平滑肌鬆弛及具鎮咳作用。
4. Chlorpheniramine Maleate具抗組織胺作用，能抑制組織胺升高所引起的流鼻涕、鼻塞、打噴嚏。

【成分】：

有效成分及含量：Each capsule Contains每粒膠囊中含：

Acetaminophen.....200mg Ethoxybenzamide.....120mg
dl-Methylephedrine HCl10mg Caffeine Anhydrous.....30mg
Noscipine10mg Chlorpheniramine Maleate2.5mg

其他成分(賦形劑)：Potato Starch、Silicon Dioxide、Povidone K-30、Tartrazine、Magnesium Stearate、Purified Water、Ethanol。

硬空膠囊0號-紅色帽/透明色身成分：Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、New Coccin、Purified Water。

【用途(適應症)】：緩解感冒之各種症狀(流鼻涕、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 - (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
 - (二) 有蕁麻疹的人。
 - (三) 懷孕28週以上的婦女。
 - (四) 18歲以下之水痘或流行性感冒症狀之解除。因其可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (一) 18歲以下。
 - (二) 有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。
 - (三) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
 - (四) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
 - (五) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
 - (六) 有心臟病及65歲以上的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (二) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
 - (三) 同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
 - (四) 曾有消化性潰瘍的人。
 - (五) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
- 四、其他使用上注意事項：
 - (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二) 避免陽光直射。
 - (三) 勿超過建議使用量。
 - (四) 不要服用本藥超過七日。
 - (五) 服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
 - (六) 酒類警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。
 - (七) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
 - (八) 不得與酒精性飲料併用。
 - (九) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張、興奮與失眠，且常會引起心悸過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年齡	劑量
18歲以上	每次1粒，一天3次，飯後半小時內服用為宜。

【警語】

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
- (三) 症狀沒有改善，或症狀還併發有發燒、或發燒持續三日。
- (四) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- (五) 服用過量(每日超過Acetaminophen 4,000毫克(mg))，或服藥後出現下列症狀：胃腸不適、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (六) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】：6~1000粒塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存】：25℃以下避光處保存。

羅得化學製藥股份有限公司 台中市大甲區東西七路一段65號