

"羅得" 治瘡 軟膏

Depiles Ointment "ROOT"

衛署藥製字第046172號
GMP G-8244

成份：每一公克軟膏中含：

Hydrocortisone.....5mg

Cinchocaine Hydrochloride(Dibucaine HCl).....5mg

賦形劑：

Polyethylene Glycol 400、Polyethylene Glycol 4000、

Butylated Hydroxytoluene、Methylparaben、Propylparaben、

Propylene Glycol、Fresh Lys 5762、DVNA 6391

藥理作用：

治瘡軟膏所含局部麻醉劑能預防及消除因壓迫性痔瘡，肛裂及肛門周圍收縮引起之疼痛；同時Hydrocortisone具有消腫、消炎、止癢作用。可去除肛門周圍之搔癢發炎，並減少黏液之滲出。

適應症：

痔瘡、肛門周圍炎、肛門龜裂。

用法用量：

於早、晚及排便後，清洗後以少量塗於痛、癢處。可將所附插管插在藥膏管口，再插入肛門內擠出。(所附插管，使用前請鎖緊，避免脫落，使用後須清潔與消毒。)

醫師藥劑師指示藥品。

禁忌症：

對本劑所含各成份過敏的病人，動物試驗有致畸胎性，但在人體方面目前尚無任何報告，但如其它類固醇製劑一樣，懷孕婦女不宜長期使用或使用高劑量。本劑含外用類固醇，不可用於下列情況：患單純疱疹病人，接受預防接種或種水痘者，或患長期肛裂者。

副作用及注意事項：

如同其它外用類固醇製劑，長期使用可能會造成下列現象，故應避免：皮膚會變薄、失去彈性、皮表面血管擴張、微血管擴張、瘀斑；上述情形，在傷口敷以不透氣敷料時最易發生，若使用局部類固醇製劑不當如：使用過量，使用部位過廣，或使用於受損皮膚、使用強效性類固醇製劑及於傷口敷上不透氣敷料，可能會造成全身性中毒；尤其在孩童，嚴重時會因抑制hypothalamic-pituitary-adrenal axis而進而抑制adrenal gland，同時亦會發生生長遲緩及Cushingoid疾病。偶有顱內壓增高現象，不過使用本劑未曾有遇上述各種副作用報告。如有續發性之細菌性皮膚感染，須同時有適當的抗菌治療。

貯存：請放置於25°C以下陰涼之處，避免陽光照射。

包裝：1000 公克以下塑膠瓶裝、鋁軟管。

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號