

"羅得" 利鼻通 液 0.05% (異每達佐林) Libiton Nasal Solution 0.05% "R.T" (Oxymetazoline)

衛署藥製字第033076號

GMP G-2018

鼻腔內的黏膜面，佈滿著很多毛細血管和脂線，如果鼻腔內的黏膜有發炎反應的時候，可能會有充血、腫脹的現象，進而造成鼻塞。

本藥可以抑制鼻子內的分泌物，消除鼻黏膜腫脹的症狀，緩解因為鼻炎引起的鼻塞症狀，讓鼻腔回舒適的通氣狀態，作用可持續12小時之久。

【有效成分及含量】：每毫升中含有：(Each ml Contains)：

Oxymetazoline HCl..... 0.5mg

【其他成分(賦形劑)】：Sodium Phosphate Monobasic Dihydrate、Sodium Phosphate Dibasic 12 H₂O、Sodium Chloride、Methyl Paraben、PropylParaben、Purified Water.

【用途(適應症)】：急性鼻炎、過敏性鼻炎、血管舒縮性鼻炎、鼻竇炎、鼻咽炎、感冒引起之鼻部充血。

【使用上注意事項】：

一、有下列情形者，請勿使用：

(一) 6歲以下。

(二) 曾因本藥成分引起過敏的人。

(三) 服用單胺氧化酶抑制劑 (MAOI)期間，或停用MAOI兩星期內。如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一) 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。

四、其他使用上注意事項：

(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。

(二) 避免陽光直射。

(三) 勿超過建議使用量。

(四) 勿連續服用本藥超過3天，過量使用可能會引起鼻充血、刺激、打噴嚏等。

(五) 噴鼻液請勿與他人共用，以避免感染。

【用法用量】：

年齡	劑量
成人及6歲以上兒童	每次兩鼻孔各噴2~3下，早晚各1次。
6歲以下兒童	請洽醫師診治。

【警 語】：

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
鼻部	灼熱感、刺痛、黏膜乾燥、打噴嚏、鼻充血
神經系統	頭痛、頭昏、失眠
其他	心悸

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一) 若有任何不適情形產生。

(二) 使用過量或是超過3天，可能引起黏膜再充血或更嚴重，如症狀持續則須接受醫師診治。

【包裝】：4000毫升以下塑膠瓶裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品

【儲存】：請置於避光、陰涼、25℃以下保存。置本品於孩童無法觸及之處。

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號