

# 氣道粘液溶化劑

"羅得" 希仕因 顆粒 20毫克/公克(乙醯半胱胺酸)  
Sistin Granules 20mg/gm "ROOT" (Acetylcysteine)

衛署藥製字第034965號  
GMP G-2844

作用：

本品為氣道粘液溶化劑，可使粘性蛋白之雙硫鍵破壞，導使濃稠的粘液水質化。

## 【成分】：

有效成分及含量：

每公克中含 (Each gm contains)：

Acetylcysteine.....20mg

其他成分(賦形劑)：

Glucose、Mannitol、Stevia、Silicon dioxide、Sucrose、Citric acid、Sunset yellow FCF、Orange powder、Purified water.

【用途(適應症)】：減少呼吸道粘膜分泌物的粘稠性。

【使用上注意事項】：

一、有下列情形者，請勿使用：

(一)曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一)吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。

(二)3歲以下。

(三)支氣管性氣喘及伴有呼吸功能不全的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：

(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二)65歲以上。

四、其他使用上注意事項：

(一)為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議使用量。

(四)不得與含酒精飲料併用。

(五)本藥會導致支氣管分泌物的增加，使用後應仔細觀察，如無法自行咳出，建議採用變換姿勢、拍痰或機械抽取等適當的處理步驟。

【用法用量】：

年齡	用法	用量
成人及12歲以上	一天3次	每次10公克(2包)
6歲以上未滿12歲		每次5公克(1包)
3歲以上未滿6歲		每次2.5公克(1/2包)
3歲以下	請洽醫師診治	

【警語】：

一、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有任何不適情形產生。

(二)有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。

(三)消化道：偶有噁心、嘔吐、食慾不振、輕微硫磺味臭氣溢出等不悅感。偶有發疹等過敏症狀。

其他：偶有血痰、惡寒、發熱、鼻水流不停、口內炎症狀發生。

【包裝】：60-1000公克塑膠瓶裝、12-200包鋁箔袋盒裝(每包5公克)。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【貯存】：請儲存於25°C以下，置於小孩伸手不及之處。避光、避免高溫與溼氣。勿於超過保存期限後使用。

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號