

祛痰治療劑  
“羅得” 得去痰膠囊 375 毫克  
(卡玻西典)

# TECYTEINE

Capsules 375mg "R.T" (Carbocysteine)

衛署藥製字第031276號

GMP G-1213

**【成分】**

**【有效成分及含量】**：每膠囊中含：(Each capsule Contains)：

Carbocysteine.....375mg

**【其他成分(賦形劑)】**：Silicon Dioxide、Potato Starch、Mag.Stearate.

硬空膠囊0號-紅色帽/黃色身成分：Gelatin、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、New Coccin、Titanium Dioxide、Tartrazine、Purified Water.

**【用途(適應症)】**：減少呼吸道粘膜分泌的粘稠性。

**【使用上注意事項】**：

一、有下列情形者，請勿使用：

(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾(慢性支氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽及咳嗽有濃痰的人。

(二) 有肝臟、心臟疾病的人。

(三) 2歲以下。

(四) 支氣管性氣喘及伴有呼吸功能不全的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項：

(一) 為防止兒童誤食，本藥請妥善保管。

(二) 避免陽光直射。

(三) 勿超過建議使用量。

(四) 不得與含酒精飲料併用。

(五) 本藥會導致支氣管分泌物的增加，使用後應仔細觀察，如無法自行咳出，建議採用變換姿勢、拍痰或機械抽取等適當的處理步驟。

**【用法用量】**：

年齡	用法	用量
成人及12歲以上	一天3次	每次2粒，有效果後減至1/3粒。
5歲以上未滿12歲		每次1/3粒。
2歲以上未滿5歲	一天4次	每次12.5~62.5mg。
2歲以下	請洽醫師診治	

**【警語】**：

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

身體部位	副作用
皮膚	發疹、紅斑
消化器官	噁心、食慾不振、胃部不快感、腹部膨滿感、下痢、口渴
其他	搔癢、鼻漏、全身壓迫感

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一) 若有任何不適情形產生。

(二) 有高燒、出疹、持續性頭痛，及持續達一星期以上的咳嗽，或有復發情形。

**【包裝】**：12~1000粒塑膠瓶裝。

**【類別】**：醫師藥師藥劑生指示藥品

**【貯存】**：置於避光、防潮、陰涼、25℃以下保存。

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號