

# "羅得"鼻感寧液

## Becandine Solution "R.T"

衛署藥製字第031519號  
GMP G-1330

成份：每 ml 含：

Triprolidine Hydrochloride.....0.25mg  
Pseudoephedrine Hydrochloride.....6mg

賦形劑：  
Dehydroacetate sodium、Sucrose、Apple、Sorbitol、Saccharin Sodium、  
Sunset Yellow FCF、New Coccine、Brilliant Blue、Ethanol、Purified Water。

作用：

Triprolidine HCl為H1組織胺受體的拮抗劑，對於鼻、眼、肺部及皮膚之過敏有效。

Pseudoephedrine Hydrochloride為一間接性交感神經劑，它能刺激交感神經末梢釋出norepinephrine作用於 $\alpha$ 及 $\beta$ 受體，尤其是上呼吸道之血管壁。因此本品能緩解非特異性的鼻粘膜充血，以及單獨使用抗組織胺無效的鼻腔過敏性症狀。

適應症：

緩解過敏性鼻炎、枯草熱所引起之相關症狀(鼻塞、流鼻水、打噴嚏、眼睛及喉部搔癢)。

用法用量：

一日3至4次，每次間隔4小時以上服用。成人及12歲以上，每次服用10ml。  
6歲以上未滿12歲，每次服用5ml。醫師藥師藥劑生指示藥品。

注意事項：

- 1.為防止兒童誤食請妥善保管。
  - 2.避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
  - 3.除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經因本類藥物引起過敏症狀者不得服用。
  - 4.勿超過建議劑量，若有不適情況產生，應立即停藥就醫。
  - 5.本藥為液劑，使用前須搖勻，並使用所附量杯量取藥量。
- 警語：
- 1.服用本藥後，可能引起倦怠感、口乾，偶有視覺上之困擾，偶見興奮反應(以幼兒及老年人較常見)。
  - 2.除非醫師處方，嚴重之代謝性肝腎疾病患者不得服用。
  - 3.除非有醫師藥師藥劑生指示，曾經有心機能障礙、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、腎機能障礙症狀者不得服用。
  - 5.老年人應小心使用本藥。
  - 6.如有呼吸之毛病或慢性支氣管炎、青光眼、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難或因前列腺腫大引起之排尿困難患者，請勿服用。
  - 7.服用本藥不得與酒精性飲料合用。
  - 8.除非有醫師藥師藥劑生指示，不得併用鎮靜劑或安眠劑等。
  - 9.服用本藥後，可能引起嗜睡現象，勿駕車或操作危險器械。
  - 10.連續服用本藥數日後，如果症狀沒有改善，應停藥立即就醫。
  - 11.不得與其他含有抗組織胺成分或鼻充血藥物或抗過敏藥等。
  - 12.本藥含Triprolidine hydrochloride，使用於6歲以下之患者前，請先詢問醫師。
  - 13.本藥含Pseudoephedrine Hydrochloride，應注意下列事項：
    - (i)除非有醫師藥師藥劑生指示，有心臟病、高血壓、甲狀腺疾病、糖尿病、前列腺腫大引起之排尿困難者不得服用本藥。
    - (ii)服用Monoamine oxidase inhibitor(MAOI)期間，或停用MAOI兩星期內，不得服用本藥，如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。

貯存注意事項：  
為防止兒童誤食請妥善保管。請貯存於室溫(15~30°C)避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。

包裝：60-4000毫升玻璃瓶、塑膠桶裝。

羅得化學製藥股份有限公司  
台中市大甲區東西七路一段65號