

利康咳 內服液

Likancough Liquid

衛署藥製字第 032934 號
GMP G-1970

本品是由三種不同藥理作用(鎮咳、祛痰、抗過敏)之有效主成分配合而成，結合三大成分的特色，彼此相輔相成，可達療效，對於常見的呼吸器官疾病，諸如：咳嗽、痰多、氣管炎、氣喘等，皆能緩解，本品並有緩解鼻塞、流鼻水、打噴嚏等過敏症狀，及加強鎮靜作用，治療咳嗽之效。

成分：每ml含：

Orciprenaline Sulfate.....0.5mg

Bromhexine Hydrochloride.....0.8mg

Doxylamine Succinate.....0.75mg

賦形劑：Dehydroacetate sodium、Sucrose、Citric acid monohydrate、EDTA-2Na、New coccin、Sorbitol solution 70%、Cherry flavor、Purified water.

適應症：

支氣管氣喘、急慢性支氣管炎、肺氣腫、痙攣性氣管炎、支氣管擴張症引起之咳嗽及咯痰。

用法用量：

通常成人劑量每次口服10ml，一日3次。小孩6~14歲每次5ml，一日三~四次，2~6歲每次5ml，一日二至三次。本藥須由醫師處方使用。

藥理作用：

A.支氣管平滑肌弛緩和止咳作用；Orciprenaline是一種長效型的擬交感神經興奮劑，對 β -交感受體有特殊的選擇作用，故可：

a.迅速弛緩支氣管平滑肌之痙攣現象而增加肺活量及解除強烈之咳嗽症狀，可緩解氣喘與支氣管炎。

b.改善心臟的興奮傳導機能，增強心臟的收縮能力，而增加心跳速率及心輸出量。

c.胃腸吸收良好、作用發生很快，而且代謝緩慢，故藥效持續長久。

B.膿痰分解作用及保護氣管、支氣管：

a.Bromhexine是一種強力祛痰劑，對於氣管粘液具有溶解稀釋作用，因能促進支氣管分泌，以稀釋粘稠的內液，而使膿痰粘度減少，而易於排除，故可增加呼吸的舒暢及減少咳嗽的次數。

b.Bromhexine胃腸吸收良好，有效劑量小、耐受性佳，適用於所有起因於分泌物之呼吸器官疾患。

C.抗組織胺作用：

a.Doxylamine為一長效型抗組織胺劑，能解除鼻充血、鼻塞、打噴嚏、流鼻水之症狀，且具有明顯的鎮靜效果，可緩和咳嗽中樞之反射作用，亦有抗噁心、嘔吐之作用，故可加強氣管擴張劑與祛痰劑，對咳嗽、氣喘等疾患之療效，並緩和症狀發作時身體之不適感。

b.Doxylamine藥效之大小與持續時間約與Promethazine同。

注意事項：

1.對其他類交感神經興奮劑有過敏反應者，亦可能對本品中之Orciprenaline Sulfate過敏。

2.Propranolol會拮抗Orciprenaline之支氣管鬆弛作用。併用其他類交感神經興奮劑會增加Orciprenaline之副作用，另酒精或CNS抑制劑或三環抗鬱之併用會增強Doxylamine或這些藥品本身之作用。併用MAO抑制劑時，可能延長Doxylamine之Antimuscarinic作用，故通常不能併用。

3.以下病症之患者小心投與：

a.心律不整病患有心跳過速情形時。

b.充血性心力衰竭及冠狀動脈疾患。

c.糖尿病。

d.高血壓。

e.甲狀腺機能亢進。

f.青光眼。

g.前列腺肥大。

h.幽門、十二指腸阻塞或膀胱頸阻塞。

i.狹窄性消化性潰瘍。

4.Doxylamine對人類妊娠之問題雖尚未被證實，不過使用時必須考慮其危險性和利益。又少量之Doxylamine會被分泌到乳汁中，而因嬰兒對Antihistamines有較高之危險性，故不能用於授乳婦人，另外因Doxylamine具有Antimuscarinic作用，可能抑制泌乳。

5.副作用：嗜眠、支氣管分泌物變濃、眩暈、胃部不適、胃痛、口中異味感、視力模糊、排尿困難或疼痛、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、心跳加速、臉頰疼痛、神經過敏、多汗、虛弱、不安、肌肉痙攣及血中氨基轉移酶增加、口鼻和喉乾燥。

貯存：室溫(15-30°C)、避光儲存。

包裝：10-4000公撮玻璃瓶、塑膠罐裝。

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號