

“羅得”利康寧內服液

Liconlin Liquid "R.T."

衛署藥製字第031494號
GMP G-1309

一般感冒除頭痛、發燒外，每有咳嗽、流鼻水、喀痰等諸症狀，因此單純的解熱、鎮痛劑，常感覺不足以緩解感冒之苦，本藥係針對緩解感冒所產生諸症狀所配合而成的一般綜合感冒劑，其作用優點有如下述：

- 1.本藥所含Acetaminophen具有解熱、鎮痛、咽喉痛、畏寒、發燒、頭痛等作用，當感冒體溫升高時，它作用於熱調節中樞，促使皮下血管擴張，以達散熱作用。
- 2.Chlorpheniramine Maleate係抗過敏劑，對感冒引起之打噴嚏、流鼻水等過敏症狀能有效地緩解。
- 3.dl-Methylephedrine Hydrochloride：本成分對人體交感神經興奮，使氣管平滑肌擴張及鬆弛而達鎮咳作用。
- 4.Potassium Guaiacol Sulfonate本成份為祛痰劑，它能促進氣管液分泌，使痰稀化易於咳出。

【有效成份及含量】：每毫升中含有：(Each ml Contains)：

Acetaminophen.....10mg Potassium Guaiacol Sulfonate.....2.5mg
Chlorpheniramine Maleate0.1mg dl-Methylephedrine Hydrochloride.....0.5mg
Caffeine Anhydrous..... 1.25mg

【其他成分(賦形劑)】：Sucrose、Propylene Glycol、Sodium Dehydroacetate、Yogurt Essence、Yellow No.4、Ethanol、Purified Water.

【用途(適應症)】：緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)。

【使用上注意事項】：

- 一、有下列情形者，請勿使用：
(一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
(一) 6歲以下。
(二) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
(三) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎或肺氣腫)所引起之持續或慢性咳嗽的人。
(四) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人、因前列腺肥大引起排尿困難的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
(一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
(二) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
(三) 同時服用含 Acetaminophen 成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
(四) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
- 四、其他使用上注意事項：
(一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
(二) 避免陽光直射。
(三) 勿超過建議劑使用量。
(四) 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
(五) 不要服用本藥超過七日。
(六) 服用過量的 Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
(七) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為 Acetaminophen (Paracetamol) 有急性肝衰竭的風險。
(八) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。
(九) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
(十) 不得與酒精性飲料併用。
(十一) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年齡	劑量
成人及12歲以上	每次10毫升，一天4次，飯後及睡前服用
9歲以上未滿12歲	適用成人劑量之1/2
6歲以上未滿9歲	適用成人劑量之1/3
6歲以下	請洽醫師診治

【警語】：

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
- (三) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
- (四) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- (五) 服用過量[每日超過Acetaminophen 4,000毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀：
胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (六) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】：10~4000毫升玻璃瓶裝、塑膠瓶裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品

【貯存條件】：置於避光、陰涼、25°C以下保存。

羅得化學製藥股份有限公司
台中市大甲區東西七路一段65號