

綜合感冒鎮咳祛痰劑  
“羅得”治咳內服液  
ZUCO Solution "ROOT"

衛署藥製字第041794號  
GMP G-6085

【有效成分及含量】：每毫升中含：(Each ml Contains)：

Acetaminophen(Paracetamol).....13.5mg Pseudoephedrine HCl.....1.5mg  
Chlorpheniramine Maleate.....0.075mg Guaifenesin.....6.7mg  
Dextromethorphan Hydrobromide.....0.8mg Caffeine Anhydrous.....1.6mg

【其他成分(賦形劑)】：Sucrose、Propylene Glycol、Strawberry Essence、Dehydroacetate Sodium、Erythrocin、Stevia、Ethanol、Water Purified。

【用途(適應症)】：緩解感冒之各種症狀(流鼻水、鼻塞、打噴嚏、咽喉痛、咳嗽、喀痰、畏寒、發燒、頭痛、關節痛、肌肉酸痛)。

【使用上注意事項】：

- 一、有下列情形者，請勿使用：
  - (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
  - (二) 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)或血清素回收抑制劑型的抗憂鬱劑(SSRI)的人。
  - (三) 服用單胺氧化酶抑制劑(MAOI)期間，或停用MAOI兩星期內。如不了解服用之藥物是否含有MAOI，請詢問醫師或藥師。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - (一) 12歲以下。
  - (二) 有肝、腎疾病或其他重大疾病的人。
  - (三) 吸菸、氣喘、慢性阻塞性肺疾病(如慢性氣管炎、肺氣腫)所引起的咳嗽的人。
  - (四) 曾診斷為下列疾病的人：心臟病、高血壓、糖尿病、甲狀腺機能亢進、因前列腺肥大引起排尿困難。
  - (五) 有呼吸疾病的人：如慢性支氣管炎、肺氣腫、慢性肺疾病、呼吸急促、呼吸困難，及青光眼的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  - (一) 孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - (二) 正在服用其他綜合感冒、止咳化痰、鼻炎、抗過敏、止痛或退燒等藥品。
  - (三) 同時服用含 Acetaminophen 成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
  - (四) 服用鎮靜藥或安眠藥的人。
- 四、其他使用上注意事項：
  - (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (二) 避免陽光直射。
  - (三) 勿超過建議使用量。
  - (四) 使用前須振搖均勻，並使用廠商所附量器量取藥量。
  - (五) 不要服用本藥超過七日。
  - (六) 服用過量的 Acetaminophen 可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含 Acetaminophen 成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
  - (七) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為 Acetaminophen (Paracetamol) 有急性肝衰竭的風險。
  - (八) 酒精警語：不得併服含酒精飲料，有急性肝衰竭及胃出血的風險。
  - (九) 可能引起嗜睡，勿駕車或操作危險性機械。
  - (十) 不得與酒精性飲料併用。
  - (十一) 避免再服用含咖啡因藥品、飲料，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】

年齡	劑量
成人及12歲以上	每次10ml，一天3次，飯後服用

【警語】：

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食欲不振。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	喉嚨疼痛、心跳加速、排尿困難、視覺模糊。

二、服用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有任何不適情況產生。
- (二) 咳嗽持續達一星期以上，或有高燒、膿痰、疹子或持續性頭痛。
- (三) 症狀沒有改善、或症狀還併隨有發燒、或發燒持續三日。
- (四) 喉嚨疼痛持續兩日以上並併有高燒、頭痛、噁心或嘔吐。
- (五) 服用過量[每日超過Acetaminophen 4,000毫克(mg)]，或服藥後出現下列症狀：  
胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (六) 有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品

【貯存條件】：請貯存於25°C以下乾燥處且避光保存。

本品為防止兒童誤食，請妥善保管。

【包裝】：10~4000毫升塑膠瓶裝。

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號