

過敏性疾患治療劑

“羅得” **得安喘錠** 1公絲 (可多替芬)

Deantran Tablets 1mg “R.T”

衛署藥製字第 032969 號
GMP G-1984

「作用」：本品可抑制組織胺及過敏性物質 SRS-A 之釋出，另可抑制因血小板活性因子 PAF 所引起之支氣管收縮，故本品可治療支氣管過敏症、支氣管喘息，本品口服吸收良好，且藥效持久。

「成份」：Each Tablet Contains：
Ketotifen(as Fumarate).....1mg

「賦形劑」：Lactose；Starch；Povidone；Tartrazine；Brilliant Blue FCF；Carmellose sodium；Magnesium stearate.

「適應症」：支氣管氣喘，過敏性鼻炎、濕疹、皮膚炎、蕁麻疹、皮膚搔癢症。

「用法用量」：本藥須由醫師處方使用。

成人一次一錠，一日二次，早餐後及睡前可依狀況增減。兒童 7 歲以上一日量 2mg，6~3 歲 1.2mg，2 歲-6 個月 0.8mg。

「注意事項」：

1. 一般注意：

(1) 稍具思睡作用，服藥中從事駕駛之患者宜十分注意。

(2) 長期接受類固醇治療之患者，投與本劑時類固醇應慢慢減量。

2. 副作用：

(1) 過敏症：偶有發疹、浮腫等過敏症狀出現，停藥即可。

(2) 精神神經系統：偶有思睡、口渴、倦怠感、頭痛等症狀出現。

(3) 胃腸：偶有噁心、腹痛、下痢、嘔吐、胃部不快感、食慾不振等症狀出現。

3. 孕婦及授乳婦女之投與：

(1) 懷孕中投與之安全性尚未確立，孕婦及有可能懷孕之婦女投與本劑前宜衡量其利弊得失。

(2) 授乳婦女避免投與本劑，必須投與時，應暫時停止授乳。

4. 藥物相互作用：同時服用鎮靜劑、催眠劑等中樞神經抑制劑及抗組織胺劑，或攝取酒精時會增強相互作用，因此遇有上述情形時應減量並慎重投與。

5. 貯存方法：室溫，避光保存。

「包裝」：4-1000 錠瓶、盒裝。

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號