

“羅得”得制痛 膠囊 200毫克(伊普)  
Degiton Capsules 200mg “R.T.”(Ibuprofen)

衛署藥製字第 031268 號  
GMP G-1209

1. 使用本藥會增加發生嚴重心血管堵塞之機率，包括心肌梗塞和中風，且嚴重的話可能會致命。上述症狀可能發生在使用此藥品的早期階段，且使用的時間越長，機率越大。
2. 進行冠狀動脈繞道手術之後14天內禁用本藥。

【成分】：

有效成分及含量：每粒膠囊中含(Each capsule contains):

Ibuprofen.....200mg

其他成分(賦形劑)：Potato Starch、Magnesium Stearate、Silicon Dioxide.

硬空膠囊1號-淺綠色帽/白色身成分：Gelatin、Titanium Dioxide、Sodium Lauryl Sulfate、Brilliant Blue FCF、Tartrazine.

【用途(適應症)】：暫時性解除頭痛、肌肉疼痛、關節炎的輕度疼痛、牙痛、背痛、輕度疼痛及與感冒有關的疼痛、經痛及解熱作用。

【使用上注意事項】：

一、有下列情形者，請勿使用：

- (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- (二) 目前有消化性潰瘍、出血或穿孔的人。曾因使用非類固醇消炎藥導致腸胃道出血或穿孔的人。具反覆發作之消化性潰瘍或出血病史的人。
- (三) 嚴重出血傾向(包括嘔吐時出血、通便出血、血便或黑便)。
- (四) 嚴重肝衰竭。
- (五) 嚴重腎衰竭。
- (六) 服用阿斯匹林(aspirin)或其他非類固醇消炎藥之後曾發生氣喘、蕁麻疹、或其他過敏反應的人。
- (七) 進行冠狀動脈繞道手術之後14天內。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

- (一) 未滿12歲，65歲以上。
- (二) 孕婦、計畫懷孕或可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (三) 曾有消化性潰瘍的人。
- (四) 有凝血功能異常或曾有相關病史的人。
- (五) 有肝臟疾病或曾有相關病史的人。
- (六) 有心臟疾病(例如心肌梗塞、心臟衰竭)或曾有相關病史的人。
- (七) 曾有藥物過敏的人。
- (八) 支氣管氣喘的人。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：

- (一) 正在使用任何藥品。
- (二) 高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸的人。
- (三) 時常飲用酒精性飲料的人。

四、其他使用上注意事項：

- (一) 服用本藥只能緩解症狀，無法治療病因。
- (二) 勿超過建議之使用量，若不慎服用過量，應立即停藥就醫，並攜帶外盒包裝以出示醫師參考。
- (三) 本藥未經醫師處方或指示，不得長期服用。
- (四) 若經醫師處方長期服用本藥，應定期回診進行臨床檢查。
- (五) 酒精警語：不得與酒精性飲料併用，可能造成胃出血。

【用法用量】：

年齡	用法	用量
成人	症狀持續時，每4~6小時服用	每次1粒。
	若服用1粒後，疼痛及發燒現象未有改善	每次2粒。
12歲以下	不得使用本藥，除非有醫師指示或監護。	

24小時內勿服用超過6粒，除非有醫師指示。須使用最小有效劑量。若服藥時有偶發性及中度心灼熱、胃不適或胃痛，可併服食物或牛奶。若上述症狀的嚴重程度為中度以上或持續發生便須就醫。

【警語】：

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	皮膚癢、起疹子。
消化系統	胃部(肚臍上方)不舒服、腸胃脹氣、便秘、拉肚子。
精神及神經系統	抑鬱。
其他	頭痛、頭暈。

二、服用本藥後，若發生下列症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

1. 已使用本藥用來退燒超過3天或用來止痛超過5天，症狀未緩解或更惡化時。
2. 有下列症狀：

身體部位	副作用
血液	再生不良性貧血(可能症狀：出血、傷口出血不止、容易感染、發燒、寒顫)、顆粒性白血病缺乏(可能症狀：容易感染、發燒、寒顫)、血小板減少(可能症狀：出血、傷口出血不止)。
過敏症	史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症(可能症狀：皮膚紅疹、搔癢或水泡；口腔潰瘍；喉嚨痛；眼睛紅腫、灼熱；臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨出現腫脹；發燒)、氣喘(可能症狀：呼吸出現喘鳴聲、呼吸短促、呼吸困難)。
眼睛	視覺異常。
耳朵	重聽、耳鳴。
肝臟	黃疸(眼白變黃)、肝功能指數GOT/GPT(AST/ALT)異常。
消化系統	胃痛或有灼熱感、血便。
口腔	口腔內炎(口腔潰瘍或發炎)。
心臟血管系統	心臟衰竭與水腫(可能症狀：疲倦、心跳加速、呼吸困難、浮腫)、心肌梗塞(可能症狀：胸部隱約疼痛、胸悶、呼吸不順暢)、低血壓(可能症狀：暈厥)。
其他	體溫過度下降、四肢冰冷。

【包裝】：8-1000粒塑膠瓶、鋁箔盒裝。

【類別】：醫師藥劑生指示藥品。

【儲存方法】：本藥應置於孩童伸手不及處，請密封置於防潮處，於30°C以下避光儲存。

羅得化學製藥股份有限公司  
台中市大甲區東西七路一段 65 號  
ROOT CHEMICAL PHARMACEUTICAL CO., LTD.