

排尿障礙治療劑

"羅得"**尿安錠** 5公絲(奧斯必得寧)
Newin Tablets 5 mg "Root" (Oxybutynin)

衛署藥製字第035467號
GMP G-3083

本品具有對平滑肌的直接抗痙攣作用，並能阻斷乙酸膽鹽(Acetylcholine)對平滑肌的作用，但對骨骼肌及自主神經節無影響，本品能抑制膀胱運動，調節排尿，使膀胱容積及排尿閾值增加，本品口服後吸收迅速，約40分後即可達血中最高濃度。

【成分】：每錠含：

Oxybutynin Chloride.....5mg

【賦形劑】：Lactose;Starch;Povidone;Avicel;Primojel;Brilliant blue FCF;Magnesium stearate.

【適應症】：因膀胱神經之控制不適所伴隨排尿諸症之緩解。

【用法用量】：成人：1次1錠，1天2至3次。

兒童(五歲以上)：1次1錠，1天2次。

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】：

1. 一般注意：由於會引起視調節障礙、思睡、投與中之患者對開車等伴有危險性之機械操作應注意。

2. 禁忌：

a. 有明顯尿路閉塞症狀、排尿困難、尿閉等之患者。

b. 青光眼、嚴重心臟病、高齡及衰弱者。

3. 慎重投與：前列腺肥大者、甲狀腺機能亢進、鬱血性心不全、不整脈、潰瘍性大腸炎、重症肝、腎疾患者。

4. 副作用：

a. 精神神經系統：偶有思睡、頭痛、嗜睡等現象。

b. 消化器官：偶有口渴、下痢、胃腸障礙、胃部不快感、嘔氣、食慾不振、便秘、腹部脹滿感、嘔吐、口內炎等現象。

c. 過敏症：偶有發疹等現象出現。

d. 泌尿系統：偶有排尿困難、尿閉、殘尿等現象。

5. 孕婦及授乳婦女之投與：懷孕中投與之安全性尚未確立，因此懷孕及可能懷孕婦女不宜投與，動物實驗顯示，本品可分泌於乳汁中，因此授乳婦女不宜投與。

6. 藥物相互作用：下列藥物併用時，會增強本劑之作用：
三環抗抑鬱藥、Phenothiazin系藥物、MAO抑制劑。

【貯存方法】：請置於避光、陰涼、防潮、室溫保存。

【包裝】：6~1000錠瓶裝，鋁箔盒裝。

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號