

# “羅得”安尿糖錠 80毫克(葛立克拉)

Anneuton Tablets 80mg “ROOT” (Gliclazide)

衛署藥製字第034348號  
GMP G-2519

作用：

本品能促進胰島素分泌而達降血糖之作用，口服後最大作用發生約在3小時後，6小時後作用消失。

成分：每錠中含

Gliclazide.....80mg

Lactose monohydrate、Avicel 102、Povidone K-30、Sodium starch glycolate、Magnesium stearate、Water purified.

適應症：糖尿病。

用法用量：

開始劑量1日40mg，每日1-2次，飯前或飯後服用。維持劑量1日40-120mg。分次服用。

本藥須由醫師處方使用。

注意事項：

1.警告：可能引起嚴重遷延性低血糖症，故應留意用法用量及使用上之注意事項。

2.一般注意：開始投與從少量開始，定期做血糖、尿糖檢查，確定藥劑之效果，效果不明確時，以他種方式代替。

3.禁忌：幼年型糖尿病患者，嚴重肝及腎機能障害患者。

4.慎重投與：腦下垂體機能不全及副腎機能不全，激烈運動後，酒精攝取過量者，高齡者。

5.副作用：

a.偶有低血糖所致之脫力感、心悸、知覺異常等症狀出現。

b.血液：偶有貧血、白血球減少等現象。

c.胃腸：偶有食慾不振、嘔吐、噁心等症狀出現。

d.過敏症：偶有皮膚搔癢感、發疹等症狀出現。

6.孕婦投與：有關懷孕中投與之安全性尚未確立，因此孕婦及可能懷孕婦女以不投與本劑為宜。

7.相互作用：

a.與本劑同時使用會增強血糖下降作用者：

胰島素製劑，Phenylbutazon，水楊酸製劑，β-阻斷劑，MAO抑制劑。

b.與本劑同時使用會降低血糖下降作用者：

副腎皮質素。甲狀腺素、利尿劑。

8.貯存：請置於陰涼、避光、防潮、室溫(25°C)保存。

9.包裝：4~1000錠鋁箔盒裝、塑膠瓶裝。

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號