

“羅得” 益雅潔消毒液

Ejajen Antiseptic Liquid “R.T.”

衛署藥製字第031600號
GMP G-1358

特徵：(1)對潰瘍、割傷、擦傷、昆蟲咬傷等有收斂作用。
(2)病房、育嬰房的消毒作用。
(3)皮膚器械物品之殺菌消毒。

【成分】：有效成分及含量：每毫升中含(Each ml contains)

Cetrimide.....30mg
Chlorhexidine Gluconate Solution(20%).....0.015ml

其他成分(賦形劑)：

Camphor、Ethanol、Methyl Paraben、Propyl Paraben、L-Menthol、Herbal oil、Flavor
、Brilliant Blue FCF、Erythrosine、Purified Water.

(薄荷味)

Camphor、Ethanol、Methyl Paraben、Propyl Paraben、L-Menthol、Peppermint
Flavor Oil、Brilliant Blue FCF、Erythrosine、Purified Water.

【用途(適應症)】：一般外用消毒劑，可當作初步傷口處理。

【使用上注意事項】

一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

(一)3歲以下。

(二)有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。

三、有下列情形者，使用前請諮詢醫師藥師藥劑生：

(一)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。

(二)2歲以下。

四、其他使用上注意事項：

(一)為防止兒童誤食請妥善保管。

(二)避免陽光直射。

(三)勿超過建議使用劑量或使用次數。

(四)使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。

(五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。

(六)本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、
陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。

(七)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼
科就醫。

(八)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。

(九)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

(十)使用前應依用法用量規定稀釋，以免灼燒皮膚。

(十一)避免接觸外耳道，尤其耳膜破裂時進入中耳，有造成耳聾之虞。

【用法用量】：

用法	用量
常規消毒病房、衣物等	本品一份對40份清水。
沖洗創傷面、產時產後局部洗滌	本品一份對20份清水。
器械、溫度計緊急消毒	本品一份對6份70%酒精。

【警語】：

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師
藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	刺激感、皮膚敏感、過敏性反應。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

(一)若有上述外之其他不適情況產生。

(二)使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】：4000毫升以下塑膠瓶裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【貯存方法】：請置於避光、陰涼、25°C以下保存。

羅得化學製藥股份有限公司
台中市大甲區東西七路一段65號