

"羅得" 舒痛液 1% (吲哚美辛)  
Anodyne Solution 1% "ROOT" (Indomethacin)

衛署藥製字第38290號  
GMP G-4543

【成分】：

有效成分及含量：每毫升中含(Each ml contains)

Indomethacin..... 10mg

其他成分(賦形劑)：Peppermint Flavor Oil、Methyl Salicylate、Cinnamon Flavor Imitation、Ethanol、L-Menthol、Camphor、Propylene Glycol、Purified Water.

【用途(適應症)】：暫時緩解局部疼痛。

【使用上注意事項】：

一、有下列情形者，請勿使用：

- (1)曾因本藥成分引起過敏的人。
- (2)曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象者。

二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：

- (1) 12歲以下兒童。
- (2)深部皮膚組織感染。

三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

- (1)孕婦、可能懷孕婦女以及哺乳婦。

四、其他使用上注意事項：

- (1)為防止兒童誤食請妥善保管。
- (2)避免陽光直射或靠近火源或熱源。
- (3)本藥為黃色液體，可能污染到衣服及寢具，使用及保存上應注意。如被污染時，盡速用水或洗劑洗淨。
- (4)本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。
- (5)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
- (6)消炎鎮痛只能緩解症狀，無法治療導致症狀發生的原因。
- (7)如不小心使用於破皮的地方，可能會有一時麻痺感產生。
- (8)皮膚的黴菌或細菌性感染有時不易與其他皮膚炎區分，如有需要應合併使用其他抗感染藥品，並謹慎觀察。
- (9)如因慢性病(例如：變形性關節炎等)使用本藥治療，應同時考慮其他治療方式，並同時觀察是否有副作用發生。
- (10)Methyl salicylate不可長期大面積使用，以免引起水楊酸中毒症狀，如呼吸困難、發汗、體溫過高、面色潮紅、持續性耳鳴、劇烈或持續頭痛，使用前請諮詢醫師或藥師。

【用法用量】：依症狀取本劑適量，一日數次塗於患部。

【警語】：

●使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

關係部位	症狀
皮膚	搔癢發疹、紅腫、麻痺感、熱感、乾燥感或腫脹。
其他	水楊酸反應(耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等)。

●使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：  
1.視覺問題、胃腸出血、尿血症、白血球減少症、血小板減少症、顆粒性白血球缺乏症。  
2.使用後自覺狀況未改善或更惡化。

【包裝】：4000毫升以下塑膠瓶裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【貯存方法】：請置於避光、陰涼、25°C以下保存。

羅得化學製藥股份有限公司  
台中市大甲區東西七路一段65號