

# "羅得" 賜連 乳膏 QUADRUPLE Cream "ROOT"

衛署藥製字第040037號  
GMP G-5355

本品含四種不同藥理作用的藥物製成，為一種廣效的局部用皮膚治療劑，對抗炎、止癢、殺菌、殺黴，有很好的作用，用以治療各種皮膚病，並對於不明致病菌之皮膚病療效顯著，賜連乳膏用以治療各種濕疹和其他過敏性和發炎性皮膚病，續發性細菌或黴菌感染(念珠菌感染)包括鼠蹊皮膚病、四肢慢性皮膚炎、紅癬、濕疹樣皮膚炎、接觸性皮膚炎、細菌性皮膚炎、毛囊皮膚炎、汗疱、甲溝炎、皮膚搔癢症、溢脂性濕疹、對麻疹、溢脂性皮膚炎、膿疱性痤瘡、膿庖症、神經性皮膚炎、對光敏感性皮膚炎、苔癬化鼠蹊皮膚病、和黴菌感染如足癬、股癬、體癬。

【成分】：有效成分及含量：每公克中含(Each gm contains)

Betamethasone Valerate..... 0.6mg  
(eq.to Betamethasone..... 0.5mg)  
Gentamicin(as sulfate).....(potency)1mg  
Tolnaftate..... 10mg  
Iodochlorhydroxyquin(Clioquinol)..... 10mg

其他成分(賦形劑)：Methylparaben、Propylparaben、Propylene Glycol、Fresh Lys 5762、Eddate Disodium、Tefose 63、Labrafil m1944、Corster 5024、Purified Water.

【用途(適應症)】：急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染；治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬(香港腳)、股癬、汗斑；溼疹或皮膚炎。

【使用上注意事項】：

- 有下列情形者，請勿使用：  
(1)曾因本藥成分引起過敏的人。(2)有皮膚結核、急性單純疱疹、天花、水痘的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫生診治：  
(1)深部皮膚組織感染。(2)3歲以下。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：  
(1)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。  
(2)正在接受醫師治療。  
(3)患部在臉上。  
(4)患部化膿。
- 其他使用上注意事項：  
(1)為防止兒童誤食請妥善保存。  
(2)避免陽光直射。  
(3)勿超過建議使用量或使用次數。  
(4)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。  
(5)本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，濕疹，浸潤、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。  
(6)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。  
(7)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。  
(8)一般黴菌感染療程至少為2週，視感染的程度、部位而定。使用本藥須完成全部療程。  
(9)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。  
(10)配方中含有類固醇成分：  
1. 癰類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。  
2. 皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。  
3. 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。  
4. 臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
- (11) 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。

【用法用量】：取適量本品塗佈於患部，一日二次至三次，治療期間視症狀進展而定，足癬可能需2-3週之治療。

【警語】

- 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎、紅、腫、水泡、脫皮。搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、皮囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張。
全身性	庫欣式症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便祕或腹瀉等)。

- 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1)若有上述外之其他不適情況產生。
- (2)自覺狀況沒有改善或更惡化。
- (3)一般黴菌治療7天症狀會改善，股癬和體癬為2週，足癬為4週，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。如即使若症狀改善停藥後，病情復發亦應立即就醫。

【包裝】：100公克以下軟管、塑膠罐裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存】：請置於25°C以下，避免陽光照射。

羅得化學製藥股份有限公司  
台中市大甲區東西七路一段65號