

廣效抗生素外用製劑  
“羅得” 鹽酸羥四環素外用軟膏  
Oxytetracycline HCl Ointment "ROOT"

衛署藥製字第055116號  
GMP G-11042

“羅得”鹽酸羥四環素外用軟膏係一種治療範圍甚廣的抗生素軟膏，以白軟石蠟及液態石蠟為基質。對於廣泛的革蘭氏陽性菌(Gram-Positive)，革蘭氏陰性菌(Gram-Negative)，螺旋體乃至大型濾過性病毒等所引起之感染疾患，具有抗菌力。

【成分】：有效成分及含量：每公克中含(Each gm contains)  
Oxytetracycline(as HCl)30mg(力價)

其他成分(賦形劑)：Vaseline、Liquid Paraffin、White Wax、Butylated Hydroxytoluene、Methyl Paraben、Propyl Paraben、Propylene Glycol。

【用途(適應症)】：急救、預防及減緩皮膚刀傷、刮傷、燙傷之感染。

【使用上注意事項】：

- (一)有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏。
- (二)有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  1. 3歲以下。
  2. 有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
- (三)有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：
  - 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- (四)其他使用上注意事項：
  1. 為防止兒童誤食請妥善保管。
  2. 避免陽光直射。
  3. 勿超過建議使用量或使用次數。
  4. 使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
  5. 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
  6. 本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。
  7. 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
  8. 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)或皮膚深部感染。
  9. 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
  10. 會使衣物染色。
  11. 請勿使用超過7天以上。
  12. 長期使用本藥，有可能引起繼發性感染(在抵抗力減弱的情形下，被另一種新的病菌感染)。
  13. 使用抗生素，有時可能導致人體內對某些抗生素無感應性的微生物過分繁殖，故必須隨時注意患處。在治療期間，如果發現新的感染，應採取適當措施。

【用法用量】：

使用次數	使用方式
通常一日2~3次	塗敷於藥棉或藥水布貼於感染部位。

【警語】：

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	過敏性皮膚炎、繼發性感染。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (1)若有上述外之其他不適情況產生。
- (2)使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】：100公克以下鋁軟管、塑膠瓶裝。

【類別】：醫師藥劑生指示藥品。

【貯存】：本品應儲存於25°C以下。

羅得化學製藥股份有限公司  
台中市大甲區東西七路一段65號