

非類固醇消炎止痛劑  
“羅得”克炎平凝膠1% (二克氯吩鈉)  
Diclofe Gel 1%" ROOT" (Diclofenac Sodium)

衛署藥製字第039693號  
GMP G-5192

【藥理作用】

本藥含Diclofenac Sodium, 抑制前列腺素 (Prostaglandins) 的生成, 而前列腺素為引起發炎, 疼痛及發燒的主要因子, 因此Diclofenac Sodium具有消炎, 止痛, 抗風濕及解熱等作用。

【成分】：有效成分及含量：每公克中含(Each gm contains)  
Diclofenac Diethylammonium..... 11.6mg  
(Eq. to Diclofenac Sodium..... 10mg)

其他成分(賦形劑)：Propylene Glycol、Methylparaben、Propylparaben、Ethanol、Menthol、Peppermint、Triethylamine、Glycerin。

【用途(適應症)】：短期使用以緩解因發炎反應引起之局部疼痛。

【使用上注意事項】：

1. 有下列情形者, 請勿使用：

- (一) 曾因本藥成分引起過敏的人。
- (二) 懷孕期的最後三個月, 因可能影響胎兒或增加生產過程之風險。
- (三) 曾對其他止痛、發燒或發炎藥品有過敏反應者, 例如Aspirin(acetylsalicylic acid)、Ibuprofen。這些藥品過敏反應的症狀可能包括：氣喘、呼吸出現哮喘聲或呼吸困難、皮膚紅疹或蕁麻疹、臉或舌頭出現腫脹、流鼻涕。

2. 有下列情形者, 使用前請洽醫生診治：

- (一) 已連續使用達2個星期。
- (二) 12歲至18歲未成年患者, 且已使用達7天。
- (三) 12歲以下兒童。
- (四) 孕婦、計畫懷孕或有可能懷孕的女性。懷孕期的前六個月應儘可能減少使用量與使用次數, 以及縮短使用期間。
- (五) 哺乳婦女, 不宜塗抹於乳房部位, 亦不宜大面積或長期使用。
- (六) 已經在使用diclofenac口服藥品或其他非類固醇消炎止痛口服藥品。
- (七) 疑似皮膚感染症。切勿使用本藥, 誤用本藥, 可能會使病情惡化, 並造成日後診斷及治療的困難。

3. 有下列情形者, 使用前請先諮詢醫師藥劑生：

- (一) 患有胃潰瘍或十二指腸潰瘍, 或曾有相關病史者。
- (二) 正在使用任何藥品, 包括不是經醫師處方之藥品。

4. 其他使用上注意事項：

- (一) 本藥僅供外用, 不可口服, 如不慎口服請立即就醫。
- (二) 請勿超過建議之用法用量。
- (三) 本藥請勿與眼睛及黏膜接觸。如不慎接觸, 請立即用清水沖洗, 若仍有不適症狀請立即就醫。
- (四) 本藥不要塗抹於紅疹或皮疹的皮膚, 亦不要塗抹於裂開的皮膚、開放性傷口或任何不正常的皮膚。
- (五) 如果忘記於預定時間使用本藥, 請依原來的使用量塗抹, 切勿使兩倍的使用量。
- (六) 使用前, 如發現本藥有疑似變質或有包裝破損情形, 請勿再使用。
- (七) 使用完畢後, 請將瓶蓋鎖緊, 保存於陰涼之處, 避免陽光直射, 並置於小孩接觸不到的地方。

【用法用量】：

用法	用量
每日使用3-4次	依據疼痛部位的面積大小來決定使用量, 每次使用量約2-4克。

依病症與病人反應來決定治療持續的時間。建議要在兩週後檢查療效。

【警語】：

- 使用本藥後, 若有發生以下副作用, 請立即停止使用, 並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	停止使用後仍有以下症狀：皮膚紅腫、發癢或刺痛。(每100人, 其中1-10人可能發生)皮膚會對光比較敏感, 可能出現曬傷的症狀, 包括發癢、紅腫及起水泡。(每1萬人, 少於1人可能發生)

- 使用本藥後, 若有發生以下症狀時, 請立即停止使用, 並接受醫師診治：

- (一) 使用後如症狀未改善或更惡化。
- (二) 皮膚紅疹且出現水泡、蕁麻疹。(每1萬人, 其中1-10人可能發生)
- (三) 呼吸出現喘鳴聲、呼吸短促、氣喘或呼吸困難。(每1萬人, 少於1人可能發生)
- (四) 臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨出現腫脹。(每1萬人, 少於1人可能發生)

【包裝】：1000公克以下鋁軟管裝、塑膠瓶裝。

【類別】：醫師藥劑生指示藥品。

【儲存】：保存於30°C以下, 避光、陰涼之處。

【過量】：Diclofenac 局部使用的全身性吸收低, 不易發生過量。如使用不當及無意的過量(如用於兒童), 可能產生顯著的全身性反應, 此時要採取一般的非類固醇抗發炎藥中毒救治措施以治療過量。

羅得化學製藥股份有限公司  
台中市大甲區東西七路一段65號