

# "羅得" 利潔爽消毒液 (普威隆碘)

## Lizensan Antiseptic Liquid

"R.T" (Povidone-Iodine)

衛署藥製字第031269號  
GMP G-1210

碘酒為眾所皆知的強力廣效殺菌劑，但因其對傷口具有強烈的刺激性且易使皮膚染成不易洗淨的棕褐色，又當傷口有膿、血液或其它分泌物存在時，碘酒就會失去效用。

而本藥不含酒精，較無上述副作用，刺激性較少，沾於皮膚或衣物上容易被洗去。使用後，可以在皮膚表面形成一層強力殺菌薄膜，更使藥效持久。

### 【成分】：

有效成分及含量：每毫升中含(Each ml contains)：

Povidone Iodine ..... 100mg  
(Equivalent to available iodine .....10mg)

其他成分(賦形劑)：Povidone、Citric Acid、Sodium Citrate、Purified Water.

【用途(適應症)】：傷口消毒。

### 【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - (一)3歲以下。
  - (二)有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
- 三、有下列情形者，使用前請諮詢醫師藥師藥劑生：
  - (一)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項：
  - (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (二)避免陽光直射。
  - (三)勿超過建議使用劑量或使用次數。
  - (四)使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
  - (五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
  - (六)本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
  - (七)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
  - (八)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
  - (九)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
  - (十)有全身性吸收之可能性，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及哺乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。
  - (十一)會使皮膚或衣物染色。

【用法用量】：以棉球沾之塗於患部。

### 【警語】：

- 一、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
  - (一)若有上述外之其他不適情況產生。
  - (二)使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。
  - (三)使用後出現蕁麻疹、浮腫、胸悶等症狀，及臉色蒼白、手腳冰冷、冒冷汗、呼吸困難等現象。

【包裝】：4000毫升以下塑膠瓶裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品

【貯存方法】：請置於避光、陰涼、25°C以下保存。

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號