

“羅得” 健髮液5%

Poolr Hair Solution 5% “Root”

衛署藥製字第050272號
GMP G-10690

【藥品說明】：

- 1.依文獻記載，局部使用本藥(Minoxidil成分)，可以刺激雄激素性禿髮者的毛髮生長，使用大約4個月或4個月以上(每個人的情況不同)開始刺激毛髮生長。但停用後預估3~4個月左右，新髮會停止生長而且恢復成治療前的樣子。
- 2.依文獻記載本藥局部使用，只有少量會有全身性吸收。

【成分】：有效成分及含量：每毫升中含(Each ml contains) Minoxidil50mg

其他成分(賦形劑)：Propylene Glycol、Ethanol、Purified Water.

【用途(適應症)】：雄激素性禿髮。

【使用上注意事項】：

- 有下列情形者，請勿使用：
 - (一)曾因本藥成分引起過敏的人。
 - (二)孕婦及哺乳婦。
- 有下列情形者，使用前請洽醫生診治：
 - (一)心臟疾病患者。
 - (二)18歲以下的人。
 - (三)65歲以上的人。
 - (四)有深部皮膚組織感染。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (一)正在使用心血管用藥或未梢血管擴張劑的人。
 - (二)正在使用其他藥品的人(包含非處方藥品)。
 - (三)兒童、可能懷孕婦女。
- 其他使用上注意事項：
 - (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二)本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)。
 - (三)本藥除了頭皮，不適合使用於身體其他部位。
 - (四)如果不小心接觸到較易敏感的部位(例如：眼睛或傷口)，應用大量的冷水清洗。
 - (五)避免陽光直射。
 - (六)勿超過建議使用量或使用次數。
 - (七)使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
 - (八)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 - (九)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
 - (十)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。

【用法用量】：

用法	使用時，毛髮及頭皮需完全乾燥，由需要使用部位為中心開始使用於頭皮，不可用於身體其他部位，使用後需徹底洗手。
用量	每日兩次，每次使用總量1mL，每日不可超過2mL。使用量與使用部位大小無關。

【警語】：

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發紅、脫皮、灼熱感、起疹子。
神經系統	頭痛、頭暈。
其他	局部水腫、呼吸急促。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)嚴重的皮膚發炎(紅腫、疼痛)、心臟不舒服、心跳加快或是血壓變化。
- (二)若有上述外之其他不適情況產生。
- (三)自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】4000毫升以下塑膠瓶裝、玻璃瓶裝。

【類別】醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存】30℃以下，置本品於孩童無法觸及之處。

羅得化學製藥股份有限公司
台中市大甲區東西七路一段65號
ROOT CHEMICAL PHARMACEUTICAL CO., LTD