

外用抗黴菌製劑
“羅得” 安黴舒噴劑
T.FREE SPRAY “ROOT”

衛署藥製字第057328號
GMP G-11688

- 1.本藥含有有效成分terbinafine具廣效抗黴菌作用。
- 2.Terbinafine不會影響荷爾蒙或其他藥物代謝，交互作用少。
- 3.根據文獻，本藥外用只有低於5%的劑量被吸收，全身性的副作用發生率低。

【成分】：有效成分及含量：每公克中含有(Each gm contains)：

Terbinafine Hydrochloride..... 10 mg

其他成分(賦形劑)：

Ethanol、Propylene Glycol、PEG 400、L-menthol、Purified Water.

(薄荷味)

Ethanol、Propylene Glycol、PEG 400、L-menthol、Peppermint Flavor Oil、Purified Water.

(薰衣草香味)

Ethanol、Propylene Glycol、PEG 400、L-menthol、Lavender Oil、Borage Extract、Purified Water.

【用途(適應症)】：治療皮膚表淺性黴菌感染，如足癬(香港腳)、股癬、汗斑。

【使用上注意事項】：

- 有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：(一)12歲以下。(二)有深部皮膚組織感染。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
(一)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。(二)正在接受醫師治療。(三)患部在臉上。
(四)患部化膿。
- 其他使用上注意事項：
(一)為防止兒童誤食請妥善保管。
(二)避免陽光直射。
(三)勿超過建議使用量或使用次數。
(四)使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
(五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
(六)本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，濕疹，浸潤、潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部。
(七)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
(八)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
(九)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
(十)一般黴菌感染療程至少為2週，視感染的程度、部位而定。使用本藥須完成全部療程。
(十一)勿接近火源。

【用法用量】：

安黴舒噴劑可依適應症一天使用1至2次，在使用安黴舒噴劑前，須將患部清洗乾淨和乾燥，將安黴舒噴劑少量噴濕於患部及其周圍。

年齡	適應症	一般治療期間
成人	體癬、股癬	1天一次/1週。
	足癬	1天一次/1週。
	汗斑癬	1天二次/1週。
老年人	尚無證據建議老年人的劑量需與年輕人不同或有不同的副作用。	
兒童	兒童使用安黴舒噴劑的經驗很少。	

通常在使用安黴舒噴劑數日後才有症狀減輕的現象，不規率或提早停止使用安黴舒噴劑會造成復發現象，在治療1週後如沒有明顯改善，須重新評估其診斷。

【警語】：

- 一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	局部皮膚刺激及灼熱感、過敏性皮膚炎：如紅、腫、水泡、脫皮、搔癢等。

- 二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)若有上述外之其他不適情況產生。
- (二)自覺狀況沒有改善或更惡化。
- (三)一般黴菌治療7天症狀會改善，股癬和體癬為2週，足癬為4週，如經過前述治療時間，症狀若沒有改善，則應停藥立即就醫。如即使若症狀改善停藥後，病情復發亦應立即就醫。

【包裝】：4000公克以下玻璃瓶裝、塑膠瓶裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【貯存】：室溫30°C以下，置本品於小孩無法觸及之處。

製造廠：羅得化學製藥股份有限公司

住 址：台中市大甲區東西七路一段65號