

解熱鎮痛劑
“羅得”制痛寧錠
Thutonine Tablets “ROOT”

GMP G-2101
衛署藥製字第033384號

【作用】：Acetaminophen及Ethoxybenzamide兩者兼具解熱及鎮痛效果，能降低體溫及減少疼痛，諸如頭痛。

【成分】：有效成分及含量：每錠中含(Each Tablet Contains)
Acetaminophen.....150mg
Ethoxybenzamide.....250mg
Caffeine.....30mg

其他成分(賦形劑)：Avicel、Lactose、Starch、Povidone、Sodium C.M.C.、Erythrosine、Magnesium Stearate.

【用途(適應症)】：退燒、止痛(緩解頭痛、牙痛、咽喉痛、關節痛、神經痛、肌肉酸痛、月經痛)。

【使用上注意事項】：

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 - (一)曾因本藥成分引起過敏的人。
 - (二)有蠶豆症的人。
 - (三)懷孕28週以上的婦女。
 - (四)18歲以下之水痘或流行性感官症狀之解除，因可能引發罕見但嚴重的雷氏症候群。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫生診治：
 - (一)12歲以下。
 - (二)成人連續服用本藥超過7天，12歲以下小孩超過3天，症狀未緩解的人。
 - (三)有肝臟疾病的人。
 - (四)有消化性潰瘍或正使用抗凝血劑的人。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥劑生：
 - (一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (二)同時服用含Acetaminophen成分之止痛、退燒或綜合感冒等藥品。
 - (三)曾有消化性潰瘍的人。
- 四、其他使用上注意事項：
 - (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
 - (二)避免陽光直射。
 - (三)勿超過建議使用量。
 - (四)服用過量的Acetaminophen可能是因為想要更快或更強的止痛效果，或是在不知道及未注意的情況下重複服用含Acetaminophen成分的藥品，但是每天服用Acetaminophen超過4,000毫克(mg)會發生肝臟損害。
 - (五)酒精警語：不得併服含酒精飲料，因為Acetaminophen (Paracetamol)有急性肝衰竭的風險。
 - (六)避免再服用含咖啡因藥品、飲品，過多的咖啡因會引起神經緊張，興奮與失眠，且常會引起心搏過速。為避免造成依賴性及肝腎傷害，不可長期使用。

【用法用量】：年齡	用量
成人及18歲以上	每次1錠。 發燒或需要時服用，若症狀持續，則每4~6小時可重複使用。每24小時內不可超過4次。飯後半小時內服用為宜。
18歲以下	請勿使用。

【警語】：

- 一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	發疹、發紅。
消化器官	噁心、嘔吐、食慾不振、胃腸不適、胃腸出血。
神經系統	頭暈、耳鳴。
其他	出血傾向、氣喘。

- 二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一)若有任何不適情況產生。
- (二)服用本藥3天後，發燒、疼痛症狀未見改善。
- (三)使用過量[每日超過4,000毫克(mg)]，或使用藥後出現下列症狀：胃腸道不適、厭食、噁心、嘔吐、蒼白及出汗等。
- (四)有過敏情形，例如：臉、口及喉嚨腫脹、呼吸困難、蕁麻疹、皮疹或其它皮膚過敏、搔癢以及嘔吐。

【包裝】：2-1000錠塑膠瓶裝、PTP鋁箔盒裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【儲存】：25°C以下於乾燥環境下儲存。

羅得化學製藥股份有限公司
台中市大甲區東西七路一段 65 號