

“羅得” 百暢舒 膜衣錠 20毫克 (旃那階)

"ROOT" Baechance F.C. Tablet 20mg (Sennosides)

衛署藥製字第 043067 號
GMP G-6720

特點：本藥可以促進腸道蠕動而達到有效的緩瀉(幫助排便)的作用，作用緩慢，服用後8~10小時開始發揮功效，通常在睡前服用。

【成分】：有效成分及含量：每膜衣錠中含(Each F.C. Tablet Contains)
Sennosides.....20mg
(eq. to calcium salt of Sennoside A&B.....12mg)

其他成分(賦形劑)：Primojel、Lactose、Povidone、Avicel、Magnesium Stearate、Sepifilm White、Sepifilm。

【用途(適應症)】：緩解便秘。

【使用上注意事項】：

- 有下列情形者，請勿使用：(一)曾因本藥成分引起過敏的人。
(二)胃腸道阻塞、腹痛、嘔吐、噁心的人。
- 有下列情形者，使用前請洽醫生診治：3歲以下嬰幼兒。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
(一)孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
(二)連續使用一星期以上。
(三)併用其他瀉劑。
- 其他使用上注意事項：
(一)為防止兒童誤食請妥善保管。
(二)避免陽光直射。
(三)勿超過建議使用量。
(四)本藥不應長期使用，一旦排便正常，即應停藥。應儘量以含纖維飲食，充分攝取水分及運動來改善便秘。
(五)本藥使用期間可能會有腹瀉發生。
(六)長期使用會造成電解質不平衡與水份缺乏。
(七)本藥會使酸性尿呈黃、棕色，鹼性尿呈粉紅或紫紅色；且會使結腸黏膜變黑。

【用法用量】：初次應使用最小劑量，再視通便情況增減用量。

年齡	用法	用量
成人及12歲以上	一日1次，於睡前 (或空腹時)服用。	1/2~1錠。
6歲以上未滿12歲		1/4~1/2錠。
3歲以上未滿6歲		1/8~1/4錠。
3歲以下	請洽醫師診治，不宜自行使用。	

【警語】：

- 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
胃腸道	噁心、嘔吐、嚴重腹痛。
其他	皮膚紅、皮膚癢、發疹等過敏症狀。

- 使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
(一)若有任何不適情況產生。
(二)腹瀉持續不止或更嚴重。
(三)有血便及自發性腸道出血狀況。
(四)使用一星期後無效。

【包裝】：1~1000錠塑膠瓶裝、鋁箔盒裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【貯存方法】：置於陰涼避光、防潮、25°C以下保存、避免陽光照射。

製造廠：羅得化學製藥股份有限公司

地址：台中市大甲區東西七路一段65號