

“羅得” 噴喉 口腔消炎噴液劑

STG Anti-inflammatory spray “ROOT”

衛署藥製字第 046541 號
GMP G-8411

【成分】：有效成分及含量：每毫升含(Each ml contains)
Benzydamine Hydrochloride.....1.5mg

其他成分(賦形劑)：

Polysorbate 20、Sodium Saccharin、Propylene Glycol、Povidone K-30、Sodium Citrate、L-Menthol、Methylparaben、Propylparaben、Ethanol、Erythrosine (Red No.7)、Pineapple Flavor、Purified Water.

(薄荷味)

Polysorbate 20、Sodium Saccharin、Sorbitol Solution 70%、Propylene Glycol、Povidone K-30、Sodium Citrate、L-Menthol、Methylparaben、Propylparaben、Ethanol、Peppermint Flavor Oil、Purified Water.

【用途(適應症)】：緩解喉嚨及口腔部位的疼痛，如喉嚨痛、舌頭或牙齦疼痛、口腔潰瘍。

【使用上注意事項】：

- 一、有下列情況者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏的人。
- 二、有下列情況者，請洽醫師診治：
 1. 6歲以下兒童。
 2. 肝腎疾病患者。
- 三、有下列情況者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 1. 孕婦、授乳婦或可能懷孕婦女。
 2. 正在使用其他藥品者(包含非處方藥)。雖然目前尚無已知與其有交互作用之藥品。
- 四、其他使用上注意事項：
 1. 若喉嚨痛為細菌感染或併發感染引起的，除了使用本藥外，應考慮加上適當的抗菌劑治療。
 2. 本藥請勿使用連續超過一周。
 3. 為防止兒童誤食請妥善保管。
 4. 兒童需於監護者的指導與監督下使用。
 5. 避免陽光直射。
 6. 勿超過建議使用量或使用次數。

【用法用量】：

成人及12歲以上兒童	每次噴4~8下，直接噴於疼痛及發炎部位。需要時，可每1.5~3小時使用一次。
6歲至12歲兒童	每次噴4下，直接噴於疼痛及發炎部位。需要時，可每1.5~3小時使用一次。
6歲以下兒童	請洽醫師診治。

【警語】：

一、服用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生

關係部位	症狀
消化系統	麻木、灼熱、刺痛、口乾及口渴、味覺改變、噁心、嘔吐、胃腸不適。
神經系	頭昏、頭痛、嗜睡。

二、服用本藥後，若有以下症狀時，請立即停用，並接受醫師診治：

(一) 全身過敏性反應，如皮膚癢疹、蕁麻疹、過敏性皮膚炎、呼吸困難、喘息、喉嚨痙攣、支氣管痙攣。

(二) 若有上述外之其他不適情況產生。

(三) 連續使用7天後症狀未改善或更惡化。

【孕婦的使用】：孕婦使用Benzydamine hydrochloride的安全性尚未建立，若要使用噴喉口腔消炎噴液劑時必須評估過，其效益性勝過其潛在的危險性，始可使用。

【孩童的使用】：由於缺乏足夠的臨床經驗，噴喉口腔消炎噴液劑不推薦使用於6歲以下孩童。

【包裝】：4000毫升以下玻璃瓶裝、塑膠瓶裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【貯存】：避光貯存於25°C以下。

羅得化學製藥股份有限公司

台中市大甲區東西七路一段65號