

濕疹、尿布疹、蚊蟲咬傷
"羅得"可膚朗乳膏
COFULAN CREAM "R.T."

衛署藥製字第031306號
GMP G-1236

【藥理作用】：本藥膏含有類固醇成分Hydrocortisone具有抗發炎作用，並且搭配含有可暫時緩解搔癢之成分Crotamiton。

【成分】：有效成分及含量：每公克中含(Each gm contains)

Crotamiton..... 100mg

Hydrocortisone Acetate..... 2.5mg

其他成分(賦形劑)：

(茉莉花香味)

Stearic Acid、Glyceryl Monostearate、Stearyl Alcohol、Lanolin Anhydrous、Propylparaben、Sorbitan Sesquioleate、Tween 60、Methylparaben、Potassium Hydroxide、Sorbitol Solution 70%、Jasmine Oil、Ethanol、Purified Water.

(薄荷味)

Stearic Acid、Glyceryl Monostearate、Stearyl Alcohol、Lanolin Anhydrous、Propylparaben、Sorbitan Sesquioleate、Tween 60、Methylparaben、Potassium Hydroxide、Sorbitol Solution 70%、Peppermint Flavor Oil、Ethanol、Purified Water.

【用途(適應症)】：暫時緩解濕疹、尿布疹、蚊蟲咬傷、皮膚搔癢、皮膚炎等皮膚疾患的症狀。

【使用上注意事項】：

- 一、有下列情形者，請勿使用：曾因本藥成分引起過敏。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 - (一)3歲以下。
 - (二)深部皮膚組織感染。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 - (一)兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
 - (二)要使用於臉部。
- 四、其他使用上注意事項
 - (一)為防止兒童誤食請妥善保存。
 - (二)避免陽光直射。
 - (三)勿超過建議使用量或使用次數。
 - (四)使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
 - (五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 - (六)本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部
 - (七)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。
 - (八)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
 - (九)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
 - (十)請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。
 - (十一)本藥不可連續使用超過7天。
 - (十二)配方中會有類固醇成分之抗發炎劑：
 1. 皮膚的黴菌或細菌性皮膚感染有時不易與其他皮膚炎區分，誤用類固醇會使病情惡化並造成日後診斷及治療之困難。
 2. 小孩長期使用較易引起庫欣氏症候群及腎上腺功能障礙。
 3. 臉部、腋部及鼠蹊部，若長期使用類固醇容易出現局部皮膚萎縮。
 4. 癬類或其他皮膚感染症，應使用抗感染劑，單獨使用類固醇會使病情惡化。

【用法用量】： 1天2~4次 塗抹薄層，以可覆蓋患部為主。

【警語】：

- 一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	搔癢、刺痛、紅斑、皮膚感染、毛囊炎、青春痘、皮膚濕軟、繼發性感染、多毛症、皮膚萎縮、痱子、毛細管擴張。
全身性	庫欣氏症候群(如滿月臉、體重增加、疲倦、高血壓、多毛症、月經異常、人格異常、水腫、多尿、多渴等)。繼發性腎上腺功能不足(如疲倦、無力、噁心嘔吐、食慾不振、體重減輕、低血壓、腹痛、便秘或腹瀉等)。

- 二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 - (一)若有上述外之其他不適情況產生。
 - (二)使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】：1000公克以下塑膠瓶裝、鋁軟管裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【貯存方法】：請置於25°C以下，避免陽光照射。

羅得化學製藥股份有限公司
台中市大甲區東西七路一段65號