

珍好碘消毒液

(普維酮碘)

Ganyodine Solution

(Povidone-Iodine)

衛部藥製字第060415號
GMP G-13452

碘酒為眾所皆知的強力廣效殺菌劑，但因其對傷口具有強烈的刺激性且易使皮膚染成不易洗淨的棕褐色，又當傷口有膿、血液或其它分泌物存在時，碘酒就會失去效用。

而本藥不含酒精，較無上述副作用，刺激性較少，沾於皮膚或衣物上容易被洗去。使用後，可以在皮膚表面形成一層強力殺菌薄膜，更使藥效持久。

【成分】：有效成分及含量：每毫升中含(Each ml contains)：

Povidone Iodine 100mg
(Equivalent to available iodine10mg)

其他成分(賦形劑)：Povidone k-30、Citric Acid、Sodium Citrate、Purified Water.

【用途(適應症)】：緊急處理擦傷、切傷、刺傷、抓傷等皮外之傷口及傷口周圍的洗淨、消毒、殺菌來防止傷口的感染。

【使用上注意事項】

- 一、有下列情形者，請勿使用：
 曾因本藥成分引起過敏。
- 二、有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
 (一)3歲以下。
 (二)有深部皮膚組織感染或大面積傷口、動物咬傷、嚴重燒燙傷。
- 三、有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
- 四、其他使用上注意事項
 (一)為防止兒童誤食請妥善保管。
 (二)避免陽光直射。
 (三)勿超過建議使用量或使用次數。
 (四)使用部位或其周圍髒污時，請洗乾淨後再用藥。
 (五)使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
 (六)本藥限於外用不得內服，亦不得施於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)、濕疹、潰爛、龜裂或嚴重外傷之患部。
 (七)請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立即前往眼科就醫。
 (八)本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
 (九)使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
 (十)有全身性吸收之可能性，因此反覆使用新生兒可能出現甲狀腺功能低下，孕婦及其胎兒及哺乳婦有造成甲狀腺腫及甲狀腺功能低下。
 (十一)會使皮膚或衣物染色。

【用法用量】：一日數次 塗抹於患部，或以紗布、脫脂棉等沾取塗抹。

【警語】：

- 一、使用本藥後，若有發生以下副作用時，請立即停止使用，並接受醫師診治：
 (一)若有上述外之其他不適情況產生。
 (二)使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。
 (三)使用後出現蕁麻疹、浮腫、胸悶等症況，及臉色蒼白、手腳冰冷、冒冷汗、呼吸困難等現象。

【包裝】：4000毫升以下HDPE塑膠瓶裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品

【貯存條件】：1.30°C以下避光陰涼處。

2.開封後之有效期間為5個月，未使用完應丟棄。

委託者：羅得國際有限公司

地 址：新北市板橋區干城路158號8樓之1

製造廠：羅得化學製藥股份有限公司

地 址：台中市大甲區東西七路一段65號