

外用鎮癢抗發炎劑  
**莎蚊納止癢 乳膏**  
Sawenan Cream

衛部藥製字第061046號  
GMP G-13827

【成分】：

有效成分及含量：每公克中含(Each gm contains)

Diphenhydramine..... 10mg

其他成分(賦形劑)：Propylene Glycol、Stearyl Alcohol、Cetyl Alcohol、Liquid Paraffin、Tween 60、Sorbitan Monostearate、Camphor、L-Menthol、Methyl Salicylate、Peppermint Flavor Oil、Methylparaben、Propylparaben、Purified Water.

【用途(適應症)】：暫時緩解尿布疹、蚊蟲咬傷、皮膚搔癢、皮膚炎等皮膚疾患的症狀。

【使用上注意事項】：

- 有下列情形者，請勿使用：
  - (一) 曾因本藥成分引起過敏。
  - (二) 2歲以下兒童。
  - (三) 曾經對阿斯匹靈或水楊酸有過敏或敏感現象者。
- 有下列情形者，使用前請洽醫師診治：
  - (一) 3歲以下。
  - (二) 有深部皮膚組織感染。
- 有下列情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：
  - (一) 兒童、孕婦、可能懷孕婦女及哺乳婦。
  - (二) 要使用於臉部。
- 其他使用上注意事項：
  - (一) 為防止兒童誤食請妥善保管。
  - (二) 避免陽光直射。
  - (三) 勿超過建議使用量或使用次數。
  - (四) 使用部位或其周圍髒汙時，請洗乾淨後再用藥。
  - (五) 使用本藥前後應徹底洗淨雙手。
  - (六) 本藥限於外用不得內服，亦不得用於眼睛四周或黏膜(如口腔、鼻腔、陰道、陰囊、外陰部等)，潰爛、龜裂或嚴重外傷的患部
  - (七) 請注意不要誤入眼睛。萬一誤入眼睛，請立刻以水或溫水沖洗，並立刻前往眼科就醫。
  - (八) 本藥勿使用於大面積之體表(以超過使用者的兩手掌面積為參考)。
  - (九) 使用後請保持塗抹部位透氣，勿密封，以免增加副作用。
  - (十) 請勿使用在患部以外，也勿當作預防使用。
  - (十一) 本藥不可連續使用超過7天。
  - (十二) 避免觸碰衣物、塑膠品、木材、金屬。
  - (十三) 不可長期大面積使用，以免引起水楊酸中毒症狀，如呼吸困難、發汗、體溫過高、面色潮紅、持續性耳鳴、劇烈或持續頭痛，使用前請諮詢醫師或藥師。

【用法用量】：

需要時使用 適量塗抹或塗擦於患部。

【警語】：

一、使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生：

身體部位	副作用
皮膚	紅斑、搔癢、刺痛感。
其他	水楊酸效應(耳鳴、暈眩、噁心、嘔吐等)。

二、使用本藥後，若有發生以下症狀時，請立即停止使用，並接受醫師診治：

- (一) 若有上述外之其他不適情況產生。
- (二) 使用7天後，自覺狀況沒有改善或更惡化。

【包裝】：1000公克以下鋁軟管裝、PP塑膠瓶裝。

【類別】：醫師藥師藥劑生指示藥品。

【貯存方法】：1.請置於30℃以下，避免陽光照射。  
2.開封後之有效期限為28天，未使用完應丟棄。

委託者：羅得國際有限公司

地址：新北市板橋區干城路158號8樓之1

製造廠：羅得化學製藥股份有限公司

地址：台中市大甲區東西七路一段65號