

111. 11. 30



“羅得國際” 益普痛膜衣錠 400 毫克

E PU TON F.C. Tablets 400mg "Root NT"

衛部藥製字第061173號

GMP-G 13947

醫師藥師藥劑生指示藥品

1. 使用本藥會增加發生嚴重心血管栓塞之機率，包括心肌梗塞和中風，且嚴重的話可能會致命。上述症狀可能發生在使用此藥品的早期階段，且使用的時間越長，機率越大。
2. 進行冠狀動脈繞道手術之後 14 天內禁用此藥。

Ibuprofen 是一種非類固醇類抗發炎藥，經由抑制前列腺素的產生，來達到減少疼痛發炎的作用。

## 1 成分

### 1.1 有效成分及含量：

每膜衣錠中含(Each F.C. Tablets Contains)

Ibuprofen ..... 400 mg

### 1.2 其他成分(賦形劑)：

Lactose Monohydrate、Potato Starch、Prejel、Sodium Starch Glycolate  
、Magnesium Stearate、Talc、Silicon Dioxide、Sepifilm 5002 Pink.

## 2 用途(適應症)：

(僅用於成人) 解熱、下列疾患及症狀之消炎、鎮痛：慢性風濕關節炎、關節痛及關節炎、神經痛及神經炎、  
背腰痛、手術及外傷後之消炎、鎮痛。

## 3 使用上注意事項：

### 3.1 有以下情形者，請勿使用：

3.1.1 曾因本藥成分引起過敏的人。

3.1.2 目前有消化性潰瘍、出血或穿孔的人。曾因使用非類固醇消炎藥導致腸胃道出血或穿孔的人。具反覆發作之消化性潰瘍或出血病史的人。

3.1.3 嚴重出血傾向(包括嘔吐時出血、通便出血、血便或黑便)。

3.1.4 嚴重肝衰竭。

3.1.5 嚴重腎衰竭。

3.1.6 服用阿斯匹靈(aspirin)或其他非類固醇消炎藥之後曾發生氣喘、蕁麻疹、或其他過敏反應的人。

3.1.7 進行冠狀動脈繞道手術之後 14 天內。

3.1.8 懷孕 28 週以上。

### 3.2 有以下情形者，使用前請洽醫師診治：

3.2.1 未滿 12 歲，65 歲以上。

3.2.2 孕婦、計畫懷孕或可能懷孕婦女及哺乳婦。

3.2.3 曾有消化性潰瘍的人。

3.2.4 有凝血功能異常或曾有相關病史的人。

3.2.5 有肝臟疾病或曾有相關病史的人。

3.2.6 有心臟疾病(例如心肌梗塞、心臟衰竭)或曾有相關病史的人。

3.2.7 曾有藥物過敏的人。

3.2.8 支氣管氣喘的人。

### 3.3 有以下情形者，使用前請先諮詢醫師藥師藥劑生：

3.3.1 正在使用任何藥品，包括不是經醫師處方之藥品。

3.3.2 高血壓、高血脂、糖尿病、吸菸的人。

3.3.3 時常飲用酒精性飲料的人。



### 3.4 其他使用上注意事項：

- 3.4.1 服用本藥只能緩解症狀，無法治療病因。
- 3.4.2 勿超過建議之使用量，若不慎服用過量，應立即停藥就醫，並攜帶外盒包裝以出示給醫師參考。
- 3.4.3 針對體重過輕的人，應盡可能於短期內以最低劑量服用來控制症狀，特別是體重過輕或年長的人，並避免長期服用。
- 3.4.4 長期服用可能增加心臟疾病發作或中風的風險。
- 3.4.5 本藥未經醫師處方或指示，不得長期使用。
- 3.4.6 若經醫師處方或指示長期使用本藥，應定期回診進行臨床檢查。
- 3.4.7 曾有資料顯示，使用本成分可能會影響排卵功能，因而導致女性生育能力衰退，一旦停止用藥情況即可好轉。
- 3.4.8 本藥為消炎藥，會減低發炎症狀，如：頭痛及體溫升高。若您感到身體不適或必須看醫師時，請告知醫師您正在服用本藥。
- 3.4.9 若您在服用本藥後感到暈眩，請勿駕駛或操作機械器具。
- 3.4.10 酒精警語：不得與酒精性飲料並用，可能造成胃出血。

### 4 用法用量：

年齡	使用劑量
成人	1次1錠，1日3次服用，每日最高劑量為1200mg。

### 5 警語：

5.1 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並持此說明書諮詢醫師藥師藥劑生。

皮膚	皮膚癢、起疹子
消化系統	胃部(肚臍上方)不舒服、腸胃脹氣、便秘、拉肚子、消化不良、胃灼熱、脹氣、噁心(感覺不適)、或者嘔吐。
精神及神經系統	抑鬱。
其他	頭痛、頭暈。


5.2 使用本藥後，若有發生以下副作用，請立即停止使用，並接受醫師診治：

5.2.1 已使用本藥用來退燒超過三天或用來止痛超過五天，症狀未緩解或更惡化時。

5.2.2 有下列症狀：

血液	再生不良性貧血(可能症狀：出血、傷口出血不止、容易感染、發燒、寒顫)、顆粒性白血球缺乏(可能症狀：容易感染、發燒、寒顫)、血小板減少(可能症狀：出血、傷口止血不止)。
過敏症	史蒂文生氏-強生症候群/毒性表皮壞死溶解症(可能症狀：皮膚紅疹、搔癢或水泡；口腔潰瘍；喉嚨痛；眼睛紅腫、灼熱；臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨出現腫脹；發燒)、氣喘(可能症狀：呼吸出現喘鳴聲、呼吸短促、呼吸困難)。
視覺	視覺異常。
耳朵	重聽、耳鳴。
肝臟	黃疸(眼白變黃)、肝功能指數 GOT/GPT (AST/ALT) 異常、肝炎。
消化系統	腸胃道出血的徵兆(排出黑色的糞便、嘔吐物帶血)、胃痛或有灼熱感、下腸道疾病(包括結腸發炎)、便秘。
口腔	口內炎(口腔潰瘍或發炎)。
泌尿系統	急性腎功能不全、血尿、腎組織發炎(腎炎)、尿量以及外觀變化。
精神及神經系統	抑鬱、感覺失調、失眠、情緒變化、焦慮、精神錯亂、幻覺、無力、迷失方向、失去記憶。
心臟血管系統	心臟衰竭與水腫(可能症狀：疲倦、心跳加速、呼吸困難、浮腫)、心肌梗塞(可能症狀：胸部隱約疼痛、胸悶、呼吸不順暢)、低血壓(可能症狀：暈厥)、血壓升高。
其他	下背部疼痛、體溫過度下降、四肢冰冷、無菌性腦膜炎(可能症狀：發燒、頸部僵硬、頭痛、噁心和嘔吐)。

- 6 包裝：6~1000 錠PTP鋁箔盒裝、HDPE塑膠瓶裝。
- 7 儲存方式：保存於25°C以下乾燥處，避免陽光直射。
- 8 類別：醫師藥師藥劑生指示藥品



修正請自行訂正及刊印

製造廠：羅得化學製藥股份有限公司  
地址：台中市大甲區東西七路一段65號

30 藥商：羅得國際有限公司  
地址：新北市板橋區千城路158號8樓之1

藥商地址請依所轄衛生局核定內容刊載